

ЛИТЕРАТУРА

1. Буземан Г. *Геометрия геодезических*. – М.: Физматгиз, 1962.
2. Ball К. *An elementary Introduction to Modern Convex Geometry / Flavors of Geometry* (ed. S.Levy). – MSRI Publications. Cambridge University Press. 1997. V.31. P.1–58.
3. John F. *Extremum problems with inequalities as subsidiary conditions / Studies and essays presented to R.Courant on his 60th birthday* (Jan.8, 1948). – Interscience, New York, 1948. P.187–204.

ЛОКАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ГЕЛЬМГОЛЬЦА-ЛИ

А.К. Гуц

In this note an answer is given to the following question: In what case is the universal covering space of a metric space M with metric ρ isometric to the Euclidean space, the Lobachevsky space, or the sphere, when M is assumed to permit rotation in Busemann's sense on some open ball neighborhood $B(x, \delta_x)$, $\delta_x > 0$, of each of its points (i.e., for any points a, a', b, b' in $B(x, \delta_x)$ such that $\rho(xa) = \rho(xa')$, $\rho(xb) = \rho(xb')$, and $\rho(ab) = \rho(a'b')$, there exists an isometry of the ball $B(x, \delta_x)$ onto itself, keeping x fixed and sending a to a' and b to b' ?

Рассмотрим метрическое пространство M с метрикой ρ , допускающее в некоторой открытой шаровой окрестности $B(x, \delta_x)$, $\delta_x > 0$, каждой своей точки x вращение в смысле Буземана, т.е. для любых точек a, a', b, b' из шара $B(x, \delta_x)$ таких, что $\rho(xa) = \rho(xa')$, $\rho(xb) = \rho(xb')$ и $\rho(ab) = \rho(a'b')$ существует изометрическое отображение шара $B(x, \delta_x)$ на себя, оставляющее точку x на месте и переводящее a в a' и b в b' . Спрашивается, в каком случае будет изометрично евклидову пространству, пространству Лобачевского или сфере универсальное накрывающее пространство для пространства M ?

Эту задачу можно рассматривать как локальный вариант знаменитой проблемы Гельмгольца-Ли. Наиболее удовлетворительное решение проблемы дано в статье Г.Фрёйденталя [1]. Аналогичные результаты были получены и другими исследователями (см. литературу в [2]).

Известен следующий локальный вариант решения проблемы Гельмгольца-Ли, принадлежащий Г.Буземану.

Теорема А. *Если каждая точка x G -пространства Буземана $\langle M, \rho \rangle$ имеет шаровую окрестность $B(x, \delta_x)$, $\delta_x > 0$, допускающую вращение в смысле Буземана, то универсальное накрывающее пространство для M является элементарным, т.е. евклидовым пространством E^n , пространством Лобачевского H^n или сферическим пространством S^n [3, с.411].* ■

© 1998 А.К. Гуц

E-mail: guts@univer.oms.sk.su

Омский государственный университет

Главным отличием излагаемого ниже результата от теоремы А является отказ от локальной продолжаемости и единственности кратчайшей.

Мы рассматриваем далее только локально компактное метрическое пространство M с внутренней метрикой ρ .

Обозначим через $r(x)$ точную верхнюю границу всех чисел $r > 0$ таких, что замкнутый шар $B'(x, r)$ является компактным подмножеством. Пусть далее $p(x)$ есть точная верхняя граница всех чисел $p_x > 0$, отвечающих точке $x \in M$ таких, что если $y, z \in B(x, p_x)$, то y соединяется с z кратчайшей. Как известно, функция $p(x)$ либо для всех x принимает значение $+\infty$, либо она всюду конечна и непрерывна.

Сформулируем следующие аксиомы.

(A1) Каждой точке $x \in M$ сопоставлено число $d(x) > 0$, обладающее свойством: если $Is(x)$ обозначает группу всех изометрий шара $B'(x, d(x))$ на себя, то $Is(x)$ действует эффективно и транзитивно на каждой сфере $S(x, r)$, где $0 < r < d(x)$ и $\lambda(x) = x$ для любой изометрии $\lambda \in Is(x)$.

(A2) Для каждой точки $x \in M$ существует число $\delta_x > 0$ такое, что

$$\delta_x < \min(d(x), r(x), p(x))$$

и выполняются условия:

а) сфера $S(x, r)$ связна для любого $r, 0 < r \leq \delta_x$;

б) существуют две различные точки $a_r, b_r \in S(x, r), 0 < r \leq \delta_x$, разделяющие $S(x, r)$, т.е. $S(x, r) \setminus \{a_r, b_r\} = A_1 \cap A_2$, где $A_1 \cup A_2 = \emptyset, A_1, A_2$ – непустые открытые в $S(x, r) \setminus \{a_r, b_r\}$ подмножества;

в) для каждого $r, 0 < r \leq \delta_x$ существует изометрия $\lambda \in Is(x)$ такая, что $\lambda(a_r) \in A_1$ и $\lambda(b_r) \in A_2$ либо $\lambda(a_r) \in A_2$ и $\lambda(b_r) \in A_1$.

(A3) Для каждой точки $x \in M$ шар $B(x, d(x))$ допускает вращение в смысле Буземана.

(A4) Для каждой точки $x \in M$ найдется точка $y \in M$ такая, что

$$\rho(xy) < \min(d(x), d(y), \delta_y).$$

(A5) Между любыми двумя кратчайшими, исходящими из произвольной точки $x \in M$, существует угол в смысле А.Д. Александрова. Причем существуют, по крайней мере, две кратчайшие, исходящие из точки x , с ненулевым углом между ними.

Заметим, что аксиома (A2) является локальным вариантом аксиом Фрейденталя (S) и (Z) (см.[1]). При этом цель условия б) – фиксировать размерность сфер, имея в виду *одномерные* сферы и, следовательно, двумерное пространство.

Аксиомы (A3) и (A4) – это всего лишь усиление аксиомы (A1). Причем (A4) позволяет исключить из рассмотрения пространства с многогранными метриками.

Определение 1. Пространство M , удовлетворяющее аксиомам (A1) – (A5), называется r -пространством.

Теорема В [2]. Пусть M полное r -пространство. Тогда M есть двумерное G -пространство Буземана, универсальное покрывающее для которого элементарно, т.е. является евклидовой плоскостью, плоскостью Лобачевского или сферой. ■

Определение 2. Назовем r -плоскостью, лежащей в пространстве M , любое подмножество $A \subset M$, которое будучи наделенным индуцированной метрикой является полным r -пространством.

Введем следующие аксиомы:

S_1 . В пространстве M существует хотя бы одна r -плоскость, и через каждые три точки из шара $B(x, \tau_x)$, $0 < \tau_x < d(x)$, где $x \in M$ – произвольная точка, проходит r -плоскость.

S_2 . Если xy кратчайшая, соединяющая x и y , такая, что $x, y \in B(z, \tau_z)$ и x, y принадлежат r -плоскости A , то $xy \subset A$.

Справедлива, анонсированная в [5],

Теорема С. Если M полное локально компактное метрическое пространство с внутренней метрикой ρ , удовлетворяющее аксиомам (A3), S_1, S_2 , то M есть G -пространство Буземана, универсальное покрывающее для которого элементарно, т.е. является одним из трех $E_n, H^n, S^n, N \geq 2$.

Доказательство. Проверим справедливость аксиом I-V G -пространства Буземана [3, с.54].

Пространство M является ограниченно компактным в силу того, что M – полное пространство с внутренней метрикой [4, с.75].

Если нам даны две различные точки x, z , то благодаря полноте пространства M существует кратчайшая xz . Следовательно, если $y \in xz$, то $\rho(xy) + \rho(yz) = \rho(xz)$.

Таким образом, для пространства M выполняются аксиомы I-III G -пространства Буземана.

Справедливость аксиомы IV вытекает из аксиомы S_1 . В самом деле, пусть $y, z \in B(x, \tau_x)$. Возьмем еще точку $u \in B(x, \tau_x)$ и проведем через y, z и u r -плоскость A . Аксиома IV говорит, что кратчайшую yz можно продолжить за точку z . Поскольку, согласно аксиоме S_2 , кратчайшая yz лежит в A , то достаточно продолжить yz за точку z в r -плоскости A . Последнее возможно, ибо A по теореме В есть G -пространство Буземана.

Докажем справедливость аксиомы V. Достаточно установить локальную единственность кратчайшей, соединяющей близкие точки. В этом легко убедиться, если обратиться к тому, как устанавливалась аксиома V при доказательстве теоремы 4 из [2] (все рассуждения делаются, по существу, для некоторой r -плоскости, проходящей через точки u, z_1, z_2 – см. подробности в [2, с.63, пункт (b)]).

Предположим, что сколь угодно близкие точки в M можно соединить не единственной кратчайшей. Пусть $x \in M$ и A некоторая r -плоскость, проходящая через x . Для r -плоскости A , согласно теореме 3 из [2], существует число